




Psykofarmaka. År 1978-2017 i DDD/TIND. Antidepressiva 1160361 personer 2022.




Antidepressiva 1160361 personer 2022. Patienter/1000 invånare Riket Båda könen 0-85+




Patienter/1000 invånare. 37 130 barn. Antidepressiva Riket 0-17 år.




Patienter/1000 invånare Antidepressiva 0-17 år 2022




Patienter/1000 invånare Antidepressiva Riket 0-17 år 2022




Patienter/1000 invånare Antidepressiva Riket 0-17 år 2022



Patienter/1000 invånare. Kvinnor Antidepressiva Riket 0-17 år.



Antidepressiva läkemedel i DDD/TIND.




— Män 15-19 år — Kvinnor 15-19 år — Män 20-24 år — Kvinnor 20-24 år

Leg. receptarie Gunnar Bergendahl

Antidepressiva Patienter/1000 invånare Riket Båda könen 0-19 år 49 492 personer.


Fluoxetin 14 615 personer har evidens och indikation.



Antidepressiva till unga personer.


- **Fluoxetin** Barn och ungdomar från 8 års ålder: Måttlig till svår egentlig depression, efter det att 4-6 behandlingstillfällen med psykologisk behandling inte gett resultat. Antidepressiv läkemedelsbehandling skall ges till barn eller ungdomar med måttlig till svår depression endast i kombination med samtidig psykologisk behandling.
- **Sertralin** Tvångssyndrom (OCD) barn/ungdomar i åldrarna 6-17 år.
- **Paroxetin ska *inte användas*** vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. I kliniska studier förekom självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades med antidepressiva läkemedel än hos dem som behandlades med placebo. Om man på grundval av kliniska behov ändå beslutar att behandla en patient under 18 år, ska patienten noggrant övervakas med avseende på eventuella självmordssymtom. Dessutom saknas uppgifter om säkerhet på lång sikt hos barn och ungdomar beträffande tillväxt och mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling.

Antidepressiva




Leg. receptarie Gunnar Bergendahl

Antidepressiva 10-14 år i PPT.




Patienter/1000 invånare Antidepressiva Riket




Leg. receptarie Gunnar Bergendahl

Antidepressiva 15-19 år i PPT.




Leg. receptarie Gunnar Bergendahl

Patienter/1000 invånare Riket Båda könen 20-24.




Antidepressiva 20-24 år i PPT.



Leg. receptarie Gunnar Bergendahl

Personer 15-19 år självmord/100000 och antidepressiva i DDD/TIND


r män 0,18 kvinnor 0,01




Leg. receptarie Gunnar Bergendahl

Personer 20 - 24 år självmord/100000 och antidepressiva i DDD/TIND

r män 0,28 och kvinnor 0,42




Dödsorsaksstatistik, Antal döda per 100 000, X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (själv mord), Riket, Båda könen. Antidepressiva läkemedel i DDD/TIND.
 $r=-0.89$




Leg. receptarie Gunnar Bergendahl

Patienter/1000 invånare Riket Båda könen 65+




N06 A antidepressiva 2022 Riket




N06 A antidepressiva 2022

Riket 0-85+



Antidepressiva



Leg. receptarie Gunnar Bergendahl

N06 A antidepressiva 65+

